

PORTUGUÊS

o texto a seguir refere-se às questões 1, 2, 3 e 4.

"Eda dos Santos vivia reclamando às vizinhas das agressões que sofria do segundo marido. E a dureza dessa vida, os tapas, e também os beijos, tudo virava versos nas mãos dessa mulher simples, uma dona de casa, que gostava de fazer poesia nas poucas horas vagas. Além de cuidar da casa e dos três filhos, ela vendia produtos da Avon de porta em porta. Foi assassinada, num dia de outubro de 1997. O marido, bêbado e tomado por um violento ataque de ciúmes, matou-a com quatro tiros de revólver."

(Lima, Paulo Pereira. "Atenção, mulheres em perigo". *Revista Caros Amigos*. São Paulo, Ed. Casa Amarela, 12/2000, p.20.)

Nas questões 1, 2, 3 e 4 assinale a alternativa correta.

1. A crase presente no primeiro período do texto explica-se porque
 - (A) os artigos femininos, mesmo quando no plural, são acentuados com crase antes de palavras no feminino, como no caso da palavra "vizinha".
 - (B) há contração entre a preposição relacionada à palavra "reclamando" e o artigo relacionado ao substantivo "vizinhas".
 - (C) a palavra "reclamando" tem sentido incompleto, o que exige complemento introduzido por preposição acentuada por crase.
 - (D) sempre que houver encontro entre preposição e artigo definido haverá crase, assinalada graficamente pelo acento grave.
 - (E) trata-se da preposição que introduz o complemento do verbo viver, e, como esse complemento é feminino ("vizinhas"), a crase é obrigatória.
2. No mesmo texto em destaque, o trecho "os tapas, e também os beijos, tudo virava versos nas mãos dessa mulher simples" trata-se de
 - (A) uma metáfora.
 - (B) uma hipérbole.
 - (C) uma metonímia.
 - (D) uma enumeração.
 - (E) uma gradação.
3. Assinale a alternativa que registra uma oração subordinada adjetiva presente no texto.
 - (A) "ela vendia produtos da Avon de porta em porta". (B) "matou-a com quatro tiros de revólver".
 - (C) "que gostava de fazer poesia nas poucas horas vagas".
 - (D) "tudo virava versos nas mãos dessa mulher simples".
 - (E) "Eda dos Santos vivia reclamando às vizinhas das agressões".

4. Sobre as expressões a seguir, presentes no texto, pode-se afirmar que

- I. "nas mãos dessa mulher"
 - II. "nas poucas horas vagas";
 - III. "de porta em porta";
 - IV. "num dia de outubro de 1997".
- (A) Todas exercem funções de advérbios nas orações em que estão inseridas.
 - (B) Nenhuma exerce função de advérbio nas orações em que estão inseridas.
 - (C) Apenas as orações "I" e "IV" são locuções adverbiais das orações em que estão inseridas.
 - (D) Apenas as orações "II" e "III" são locuções adverbiais das orações em que estão inseridas.
 - (E) Apenas a oração "III" tem função de advérbio na oração em que está inserida.

O texto a seguir refere-se às questões 5, 6 e 7.

Símios processam operações matemáticas

O cérebro dos símios pode trabalhar com quantidades numéricas e seria capaz de realizar pequenas operações matemáticas, segundo um estudo da Universidade de Tübingen (Alemanha) apresentado ontem na Áustria. Eles teriam sido capazes de distinguir número de pontos em uma tela, de acordo com Andreas Nieder, diretor do Instituto para o Estudo Clínico Cerebral da Universidade. Durante o experimento, os cientistas acompanharam a atividade neuronal através de eletrodos cerebrais e identificaram quais células eram as que mostravam mais atividade e as que eram responsáveis por processar a informação numérica.

(*O Estado de S. Paulo*. 11/07/06, p. A 15)

5. Assinale a alternativa em que o uso do verbo revela distanciamento do autor da notícia em relação aos resultados da experiência realizada:
 - (A) "eram responsáveis por processar a informação numérica".
 - (B) "identificaram quais células eram as que mostravam mais atividade".
 - (C) "os cientistas acompanharam a atividade neuronal através de eletrodos".
 - (D) "O cérebro dos símios pode trabalhar com quantidades numéricas".
 - (E) "Eles teriam sido capazes de distinguir número de pontos em uma tela".

6. Sobre as expressões a seguir, presentes no texto, é correto afirmar que

I. "capazes de distinguir".

II. "responsáveis por processar".

(A) No item "I", a palavra "capazes" não necessita de complemento à sua significação: por isso, o termo que a sucede é um adjunto adnominal. Já no item "II", a palavra "responsáveis" necessita de complemento à sua significação; portanto, o termo que a sucede é um complemento nominal.

(B) No item "I", a palavra "capazes" necessita de complemento à sua significação; por isso, o termo que a sucede é um complemento nominal. Já no item "II", a palavra "responsáveis" não necessita de complemento à sua significação, em razão do que o termo que a sucede é um adjunto nominal.

(C) No item "I", a palavra "capazes" não necessita de complemento à sua significação: por isso, o termo que a sucede é um adjunto adnominal, assim como no item "II", em que a palavra "responsáveis" é sucedida por um adjunto nominal.

(D) No item "I", a palavra "capazes" não necessita de complemento à sua significação; por isso, o termo que a sucede é um adjunto adverbial, assim como no item "II", em que a palavra "responsáveis" é sucedida por um adjunto adverbial.

(E) Tanto no item "I" quanto no item "II", os termos que sucedem respectivamente as palavras "capazes" e "responsáveis" são complementos nominais por completarem sintaticamente palavras que os prevêm em sua significação,

7. Assinale a alternativa em que uma expressão, um termo ou uma palavra presente no texto apresente a mesma função sintática da conjunção subordinativa conformativa "segundo", também presente nele.

(A) "e seria capaz de realizar pequenas operações matemáticas".

(B) "de acordo com Andreas Nieder".

(C) Durante o experimento".

(D) "por processar a informação numérica".

(E) "para o Estudo Clínico Cerebral da Universidade",

8. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do pronome.

(A) Logo ao chegar, cumprimentou-lhe pela vitória.

(B) Forçou a visão, mas não avistou-o mais.

(C) Nunca lhe ocorrera uma sorte tão grande.

(D) Me comunicaram a chegada do navio ontem.

(E) Você venha logo, que te conto o que ocorreu.

o texto a seguir refere-se às questões 9, 10, e 11.

Consolação

Se não tivesse o amor

Se não tivesse essa dor

E se não tivesse o sofrer

E se não tivesse o chorar

Melhor era tudo se

acabar.

Eu amei

Amei demais

O que eu

sofri

Por causa do

amor Ninguém

sofreu.

Eu chorei

Perdi a

paz

Mas o que eu

sei É que

ninguém Nunca

teve mais Mais

do que eu.

(Moraes, Vinicius de. *Songbook*. Pelrópolis. Lumiar Ed. 1993, p.54).

Nas questões 9, 10, e 11

assinale a alternativa

adequada.

9. Do ponto de vista semântico, predominam no texto de Vinicius de Moraes

(A) palavras que expressam experiências individuais negativas.

(B) palavras que expressam experiências individuais positivas

(C) palavras sem carga semântica em que o poeta deposita sentidos negativos.

(D) palavras cujas cargas semânticas são subvertidas pelo poeta.

(E) palavras cujas cargas semânticas positivas são subvertidas.

10. No texto, o poeta emprega o verbo ter:

(A) com sentido de posse; por isso concorda com os sujeitos ocultos, na terceira pessoa do singular, das orações em que ele ocorre.

(B) na função de verbo de ligação, visto que os termos que o sucedem nas orações são predicativos do sujeito, com os quais concorda.

(C) como verbo bitransitivo com sujeitos ocultos e os objetos "amor", "dor", "sofrer" e "chorar".

(D) em lugar do verbo haver, com sentido de existir; por isso assume o caráter impessoal desse verbo quando estiver na 3ª. pessoa do singular.

(E) na função de verbo transitivo indireto, visto que os termos que o sucedem nas orações são objetos indiretos, com os quais concorda.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Em relação às palavras "sofrer", "chorar" e "acabar" pode-se dizer que
- (A) todas são verbos no infinitivo pessoal e funcionam como verbos nas orações em que estão inseridas.
 - (B) todas são verbos no infinitivo, mas a primeira e a segunda estão substantivadas, enquanto a terceira cumpre função de verbo.
 - (C) todas são verbos no presente do indicativo e funcionam como verbos nas orações em que estão inseridas.
 - (D) todas são verbos no presente do indicativo, mas a primeira e a segunda estão adjetivadas, enquanto a terceira cumpre função de verbo.
 - (E) todas são verbos no infinitivo pessoal, mas nenhuma funciona como verbo nas orações em que estão inseridas.
12. No texto a seguir, as preposições em destaque indicam respectivamente:
- "Fomos de São Paulo a Recife de avião com nossos amigos"
- (A) origem, destino, meio, companhia.
 - (B) lugar, meio, posse, companhia.
 - (C) meio, lugar, companhia, posse.
 - (D) origem, meio, companhia, posse.
 - (E) destino, origem, posse, companhia.
13. Apenas uma das alternativas a seguir registra acentuação correta:
- (A) estaram (futuro), estãoam (passado), ficarão (passado);
 - (B) órgão-organismo, orfão-orfandade;
 - (C) tem (verbo ter, singular), têm (verbo ter, plural);
 - (D) veêm (verbo ver, plural); têm (verbo ter, plural)
 - (E) íris, juiz, matriz, juízo.
14. Assinale a alternativa em que a ortografia está correta.
- (A) pagem, forrajem, estalajem.
 - (B) paraguassu (do tupi), champu. Chingu (do tupi).
 - (C) giló; geric6, jeringonça (do espanhol).
 - (D) viagem (verbo), viaje (verbo) viagem (substantivo).
 - (E) cantão (verbo). cançam (verbo) cantam (substantivo).
15. Paciente do sexo masculino, 65 anos, trabalhador rural, pele clara, chegou ao consultório com as seguintes características: lesão caracterizada por degeneração tecidual do vermelhão de lábio, principalmente do lábio inferior, que se apresentava atrófico e com erosões de superfície crostosa. O diagnóstico mais provável é
- (A) Leucoplasia.
 - (B) Linfoma não-hodgkin.
 - (C) Queilite actínica.
 - (O) Sarcoma de kaposi .
 - (E) Lliquen plano.
16. São tumores maligno e benigno, respectivamente
- (A) Ameloblastoma e fibroma ossificante.
 - (B) Míxoma odontogênico e mieloma múltiplo.
 - (C) Osteossarcoma e fibroma ossificante.
 - (D) Míxoma odontogênico e ameloblastoma.
 - (E) Osteoblastoma e condrossarcoma.
17. Um menino de 8 anos de idade compareceu à clínica odontológica com o dente 11 avulsionado, devido a uma queda de bicicleta há 40 minutos. A mãe traz o dente em um copo de leite. Durante o exame clínico, constata-se ausência de lesões na tábua óssea, tecidos moles e no elemento dental. A conduta nesse caso é
- (A) transplante dentário.
 - (B) tratamento do canal e transplante dentário.
 - (C) reimplante dentário.
 - (D) limpeza profunda das raízes com clorhexidina 2% e posterior implante.
 - (E) transfixação dental.
18. Para a confecção de um núcleo metálico fundido no dente 44, tratado endodonticamente e saudável periodonticamente, o núcleo deve ter um comprimento adequado de:
- (A) 2/3 do comprimento total de seu remanescente.
 - (B) 1/3 do total de seu remanescente.
 - (C) Tamanho real da raiz do remanescente
 - (D) 3/4 do total de seu remanescente.
 - (E) Comprimento compatível com a liga metálica.
19. O fluxo salivar, dentro dos padrões de normalidade, é aquele que está em
- (A) 0,1 mL/min
 - (B) 0,5 mL/min
 - (C) 1,0 mL/min
 - (D) 2,5 mL/min
 - (E) 3,7 mL/min

20. Na exodontia do dente 17, com raiz palatina divergente, de um paciente cujo seio maxilar apresenta-se baixo e expandido entre as raízes, o procedimento comumente indicado é
- (A) . Sepultamento radicular.
 (B) Seccionamento dentário.
 (C) O uso de fórceps.
 (D) A luxação.
 (C) A incisão Le For! 11.
21. Preocupada com a estética de seu sorriso, uma paciente de 18 anos de idade comparece à clínica odontológica. Sua queixa é uma mancha de cor branco-amarelada na região vestibular dos dentes superiores (14 ao 24). Observa-se que as manchas não são profundas, estão restritas ao esmalte e o diagnóstico é de fluorose leve. Para a remoção dessas manchas, de forma conservadora, o procedimento é:
- (A) Restauração com resina composta.
 (B) Remineralização.
 (C) Microabrasão.
 (D) Facetas de porcelana.
 (E) Aplicação de flúor tópico 2% semanal.
22. Paciente adulto será submetido a um aumento de coroa clínica. Sabendo-se que ele pode tomar medicação via oral, que não relata nenhum tipo de alergia e há 6 meses sofreu uma cirurgia para implante de prótese valvar cardíaca, a medicação pré-operatória mais adequada é:
- (A) Amoxicilina (500mg) _ 4 comprimidos, 1 h antes do procedimento.
 (B) Dipirona (500mg) - 2 comprimidos, 1 h após o procedimento.
 (C) Penicilina V (500mg) - 1 comprimido 1 h antes do procedimento.
 (D) Dipirona (500mg) - 2 comprimidos , 1 h antes do procedimento.
 (E) Diazepan (5mg) - 1 comprimido, 1 h antes do procedimento.
23. Um pai leva o filho de 11 anos de idade com queixa de dor (provocada) no dente 36, devido a processo carioso. Esse dente apresenta-se com extensa destruição coronária, e parte da coroa remanescente encontra-se recoberta por uma massa polpuda de tecido avermelhado e aspecto esponjoso, que sangra a palpação. Pela radiografia, constata-se comunicação da cárie com a cavidade pulpar e discreta rarefação óssea periapical. Diante disso, assinale a alternativa que melhor traduz o diagnóstico clínico e o tratamento.
- (A) Pericoronarite e necropulpectomia.
 (B) Pulpite reversível e tratamento expectante.
 (C) Pulpite hiperplásica e pulpectomia.
 (D) Pulpite hiperplásica e tratamento expectante.
 (E) Pulpite reversível e curetagem pulpar.
24. A dentística restauradora responde por uma grande parcela de todos os procedimentos realizados em odontologia e, apesar de um declínio da cárie dentária, ainda são necessários procedimentos restauradores para reparar lesões cáries não controladas por métodos preventivos. Diante disso, assinale a alternativa correta.
- (A) O acesso direto à lesão com destruição da crista marginal tornou-se opção de grande valor para o tratamento da lesão.
 (B) A extensão para remoção de esmalte sem suporte e dentina é algo cada vez mais necessário para se preservar as restaurações por mais tempo.
 (C) Considera-se o melhor tipo de acesso à lesão aquele que possibilita a remoção da cárie e a preservação da estética mesmo que haja remoção de estrutura dental sadia.
 (D) Lesões de cárie paralisada e mancha branca devem ser restauradas devio à estética.
 (E) A extensão do preparo cavitário como forma de retenção foi abandonada.
25. Os medicamentos que afetam a função da glândula salivar pertencem ao grupo dos
- (A) antiinflamatórios e antibióticos.
 (B) analgésicos e antiinflamatórios.
 (C) antidepressivos e antibióticos.
 (D) antidepressivos e ansiolíticos.
 (E) antiinflamatórios e anticoncepcionais.
26. Quando, em pacientes portadores de prótese total, o espaço funcional livre é diminuído ou aumentado, os sinais e sintomas são, respectivamente
- (A) pronúncia sibilante e alteração estética.
 (B) pronúncia sibilante e cansaço dos músculos da face.
 (C) dor e atuação conjunta dos músculos.
 (D) cansaço dos músculos da face e pronúncia sibilante.
 (E) equilíbrio entre os músculos da face e pronúncia grave.
27. Durante a obturação radicular do dente 11 de um paciente de 27 anos, o cirurgião dentista se deparou com um problema: o diâmetro do canal era maior do que o cone de obturação que o cirurgião dentista possuía. O procedimento correto a ser realizado para finalizar o tratamento é
- (A) colocar curativo de hidróxido e trocá-lo de 15 em 15 dias durante 6 meses para que diminua o diâmetro do canal.
 (B) não utilizar cone principal.
 (C) segurar o cone na posição desejada e fazer a condensação lateral.
 (D) preencher o canal radicular apenas com o cimento obturador.
 (E) cortar o cone mais volumoso até que se consiga a parada apical desse cone, processando a obturação naturalmente.

28. Paciente de 14 anos apresenta lesão cariiosa extensa no dente 17. Exame radiográfico mostra lesão próxima à polpa, mas não evidencia comunicação com a câmara pulpar, e os resultados dos testes de vitalidade não foram confiáveis. O cirurgião dentista não anestesia o paciente e durante o procedimento de remoção da cárie interrompe o procedimento de remoção ao perceber que o paciente começa a sentir dor e há possibilidade de exposição. O procedimento a ser tomado a partir desta fase é:
- (A) Remoção total da lesão cariiosa e capeamento pulpar direto.
- (B) Remoção total da lesão cariiosa e pulpotomia.
- (C) Remoção da maior parte de lesão cariiosa possível e capeamento pulpar direto.
- (D) Remoção da maior parte de lesão cariiosa possível e capeamento pulpar indireto.
- (E) Remoção da maior parte de lesão cariiosa possível e pulpectomia.
29. O nervo que deve ser anestesiado para a exodontia do 43, além do nervo alveolar inferior, é:
- (A) Bucal.
- (B) Lingual.
- (C) Mentoniano
- (D) Milohioidiano
- (E) Incisivo.
30. A dor é um dos sintomas mais comum ente conhecidos em odontologia. Em relação aos anestésicos locais, assinale (V) verdadeiro ou (F) falso nas sentenças abaixo, e em seguida assinale a alternativa correta.
- () dentre os anestésicos locais de longa duração, podemos citar a Bupivacalna.
- () a metemoglobina pode ocorrer após anestesia local, caso a droga usada seja a Prilocalna.
- () s anestésicos locais, quando aplicados em tecido inflamado, **não** atuam de maneira eficaz devido à alteração de pH.
- () os anestésicos com vasoconstritor são utilizados principalmente com a finalidade de diminuir o tempo de ação da droga utilizada.
- (A) FVVF
- (B) V F F V
- (C) VV F F
- (D) FFFV
- (E) VVV F
31. A fluoretação das águas de abastecimento público está enquadrada em qual nível de prevenção?
- (A) limitação do dano
- (B) proteção específica
- (C) diagnóstico precoce e pronto-atendimento
- (D) promoção de saúde
- (E) reabilitação
32. O primeiro e mais importante mecanismo natural de ortopedia funcional dos maxilares é
- (A) amamentação no seio materno.
- (B) sucção de mamadeira.
- (C) sucção intrauterina.
- (D) sucção de dedo.
- (E) respiração bucal.
33. O tipo de manlenedor de espaço que melhor pode prevenir a extrusão dos dentes do arco oposto é:
- (A) Arco lingual.
- (B) Coroa e alça.
- (C) Arco palatino.
- (D) Banda e alça invertida.
- (E) Removível com platô em acrílico.
34. Em relação ao sigilo profissional, assinale a alternativa que não constitui infração ética.
- (A) Revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão.
- (B) Revelar, com justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão.
- (C) Negligenciar orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional.
- (D) Fazer referência a casos c1nicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais.
- (E) Revelar, por culpa, fato sigiloso .
35. Em uma determinada comunidade, utilizando o índice cpao, foi realizado um diagnóstico para a implementação futura de programas de promoção em saúde bucal. Dois meses depois, algumas crianças começaram o tratamento odontológico e alguns dentes foram restaurados. Com essas informações, pode-se concluir que
- (A) aumentou o número de dentes obturados alterando o resultado final obtido pelo Índice e portanto o diagnóstico daquela comunidade.
- (B) se hipoteticamente o índice era de 5,2, esse valor foi aumentado, pois aumentou o número de dentes restaurados.
- (C) é necessária a associação do índice de Oean para que seja possível avaliar o diagnóstico final da comunidade.
- (D) Deve ser feito um novo levantamento utilizando o índice de Oean.
- (E) O resultado quantitativo final obtido com o índice CPOO não foi alterado.

36. Considere a situação a seguir. Julgue as afirmativas como (V) verdadeiro ou falso (F) e assinale a alternativa correta. Uma paciente adulta, 35 anos, foi submetida a exodontia do dente 38 sem *intercorrências*. Solicita ao cirurgião dentista um atestado com objetivo de justificar falta ao trabalho por 3 dias consecutivos. Nesta situação, você, como cirurgião dentista

- () está Impedido por legislação trabalhista de emitir este tipo de atestado.
- () deve utilizar os códigos preconizados pelo CID-10 para emissão deste atestado.
- () faltaria à verdade se emitisse este laudo, ficando sujeito às penalidades previstas pelo Código de Ética Odontológica.
- () elabora o atestado segundo as normas clássicas, incluindo um laudo de incapacidade para o trabalho.
- () deve notificar o caso compulsoriamente à Vigilância Sanitária.

- (A) VVV F F
(B) F FV F F
(C) V F V FV
(D) V F V F F (E) F F V F V

37. Na dentição decidua, os espaços primatas encontrados estão situados

- (A) distais aos incisivos laterais e mesiais aos incisivos laterais inferiores.
- (B) mesiais incisivos laterais superiores e distais aos incisivos centrais inferiores.
- (C) mesiais aos caninos superiores e distais aos caninos inferiores.
- (D) distais aos caninos superiores e mesiais aos caninos inferiores.
- (E) mesiais aos primeiros molares inferiores.

38. Paciente, sexo masculino, 22 anos, compareceu ao consultório odontológico apresentando as seguintes características no elemento dental 24: dor, inversão papilar ou cratera gengival, sangramento espontâneo, odor fétido e pseudomembranas. Esse quadro define:

- (A) Gengivite ulceronecrosante aguda.
- (B) Gengivite descamativa.
- (C) Sífilis primária.
- (D) Estomatite herpética. (E) Abscesso periapical.

39. Durante uma avaliação nas escolas públicas da cidade de Cruzeiro, o Índice utilizado foi o "Índice de Deciduos". Neste índice, os dentes extraídos anteriormente não são incluídos. Isso porque
- (A) quando temos ausência do decíduo é porque o permanente já ocupa o seu lugar.
 - (B) o dente ausente poderia ser um exanumerário.
 - (C) na presença do dente decíduo e do permanente que ocupará seu lugar é avaliada apenas a condição do permanente.
 - (D) não são incluídos para facilitar os cálculos.
 - (E) podem influenciar os cálculos e futuros programas de prevenção.
40. Sabemos que o cirurgião-dentista deve manter alguns medicamentos de uso emergencial em seu ambiente de trabalho. Todo atendimento de primeiros-socorros exige, por parte de qualquer pessoa que irá executá-lo, pronto diagnóstico da gravidade da situação, bom conhecimento do que deve ser feito e muita rapidez na sua execução. Em muitas ocasiões, a prestação inadequada ou precipitada dos serviços de primeiros-socorros pode agravar o quadro e até mesmo provocar lesões orgânicas irreversíveis. Diante disso, julgue as afirmativas abaixo e suas associações como (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa correta.
- () Adrenalina: é indicada em convulsões. Possui contra-indicação relativa. Tem uso oral, intramuscular ou intravenoso. Comprimidos de 5 e 10mg. Ampolas de 2ml com 10mg.
 - () Insulina: é indicada no controle da hipoglicemia. Tem uso intravenoso, de aplicação lenta, em ampolas de 10 e 20mL a 5, 10, 25, 30, 40 e 50%.
 - () Dinitrato de Isossorbida (Isordil): é indicado na angina pectoris e no infarte do miocárdio. Possui contra-indicação na hipotensão arterial. Em comprimidos para uso sublingual de 5, 10 e 20mg.
 - () Dinitrato de Isossorbida (Isordil): é indicado no choque anafilático. Possui contra-indicação da hipertensão arterial e na Doença de Cushing. Tem uso intramuscular ou intravenoso, em ampolas de 1mL com 3mg.
 - () Acetato de butametasona (celestone soluspam): é indicado na angina pectoris e no infarte do miocárdio. Possui contra-indicação na hipotensão arterial. Em comprimidos para uso sublingual de 5, 10 e 20mg.
- (A) V V F V V (B) V V F F F (C) F F V F F (D) F F V V V (E) V V F F F