

12)Comparando-se a eficácia do fio dental encerado, da fita dental e do superfloss, como instrumento para a remoção de placa proximal, o aumento dos índices de placa, em ordem decrescente, ocorre com o uso do(a):

- a) fio dental, a fita dental e o superfloss
- b) superfloss, o fio dental e a fita dental
- c) fita dental, o superfloss e o fio dental
- d) fita dental, o fio dental e o superfloss

13)A melhor época para o aconselhamento dos pais e o estabelecimento de um programa preventivo é:

- a) antes do nascimento
- b) ao nascer o primeiro dente
- c) entre 6 meses e 1 ano de idade
- d) entre 1 ano e 2 anos de idade

14)O aumento de cárie na puberdade pode ser explicado pela(s):

- a) diminuição do fluxo salivar e hábitos dietéticos precários
- b) alteração da composição da placa bacteriana e baixa auto-estima
- c) mudanças hormonais e hábitos dietéticos precários
- d) baixa auto-estima e alteração da composição salivar

15)As manifestações orais mais comuns da anemia ferropriva incluem:

- a) fissuras na mucosa jugal e palato mole
- b) gengivite generalizada e glossites
- c) estomatite e doença periodontal
- d) glossites e fissuras na comissura labial

16)Das técnicas de anestesia intra-oral, a que anestesia os ramos das terminações livres é a (o):

- a) infiltração local das terminações nervosas
- b) bloqueio dos ramos terminais
- c) bloqueio dos ramos acessórios
- d) bloqueio dos ramos medianos e anterior

17)No bloqueio do nervo infra-orbitário, a agulha anestésica em sua posição final no orifício do canal infra-orbitário deve estar:

- a) sob a cabeça do músculo quadrado do lábio superior
- b) abaixo do ponto do músculo canino
- c) anterior ao plexo venoso pterigoideo
- d) na linha mediana do palato

18)Um dos marcos anatômicos de referência para o bloqueio do nervo alveolar superior posterior é a(o):

- a) borda anterior e processo coronóide do ramo da mandíbula
- b) borda do músculo temporal
- c) superfície supratemporal da maxila
- d) triângulo retromular

19)No bloqueio do nervo palatino anterior, a agulha é mantida o mais próximo possível da curvatura do osso palatino, em ângulo:

- a) agudo
- b) reto
- c) obtuso
- d) nulo

20)O bloqueio clássico do nervo alveolar inferior pode ocasionalmente anestésiar o nervo:

- a) alveolar superior
- b) mandibular
- c) mentoniano
- d) lingual

21)O primeiro composto anestésico local não-éster usado em odontologia foi a:

- a) lidocaína
- b) cloroprocaína
- c) rovoacaína
- d) novocaína

22)Área radiotransparente, em forma de coração bilateral, simétrica e bem delimitada, sugere cisto:

- a) maxilar anterior mediano
- b) glóbulo-maxilar
- c) palatino
- d) nasoalveolar

23)Constitui uma medida eficaz para prevenir a cárie dentária de fossetas e fissuras, a colocação de:

- a) nitrato de prata
- b) ferrocianeto de potássio
- c) selantes
- d) amálgama de prata

24)É procedimento incorreto sobre o tratamento dentário do paciente com úlcera péptica:

- a)realizar consultas mais curtas
- b)usar analgésicos seletivos
- c)dispensar profilaxia e exames freqüentes
- d)considerar o uso de técnicas de sedação auxiliar

25)Como característica clínica da Glossite Romboidal Mediana podemos citar:

- a)placa ovóide, losangular, avermelhada, na superfície dorsal da língua
- b)numerosos sulcos ou ranhuras na superfície dorsal da língua
- c) fusão entre a língua e o assoalho da boca
- d)língua pequena ou rudimentar

26)Como alternativa analgésica de ação periférica para a aspirina e o acetaminofeno, cita-se:

- a)naloxona
- b)diflunisal
- c)sufentanil
- d)meperidina

27)Os anestésicos locais interferem com a transmissão nervosa através do bloqueio da influência da estimulação sobre a condutância dos íons de:

- a)sódio
- b)cálcio
- c)potássio
- d)magnésio

28)Os tumores das glândulas salivares têm localização habitual na seguinte ordem de freqüência:

- a)lábio, língua, palato e bochecha
- b)língua, lábio, palato e bochecha
- c)palato, lábio, bochecha e língua
- d)palato, língua, bochecha e lábio

29)Dentre os grupos de antibióticos que causam reações tóxicas auditivas, vestibulares e renais, podemos citar os (as):

- a)aminoglicosídeos
- b)sulfonamidas
- c)cefalosporinas
- d)lincomicinas

30)A manifestação bucal mais constante nos pacientes com Diabete Melito não controlado é a:

- a)xerostomia
- b)formação de abscessos recorrentes
- c)cárie
- d)doença periodontal

31)Um vaso constritor é um adjunto valioso para uma solução anestésica local, porque:

- a)acelera a ação da droga
- b)possibilita o uso de volumes maiores
- c)acelera a reabsorção e retarda a eliminação
- d)retarda a reabsorção e reduz a toxicidade

32)Em relação à atrição dental, resultante do contato entre dentes no ser humano, podemos afirmar que:

- a)é um fenômeno essencialmente patológico
- b)não é patológico
- c)é um fenômeno mais fisiológico do que patológico
- d)não pode ser observada na dentição decídua

33)O termo “AERODONTALGIA“, causado por dor de dente devido a grande altitude, está relacionado com:

- a)pulpite subclínica
- b)tratamento de canal incompleto
- c)cárie de dentina
- d)dente necrosado

34)Os cistos fissurais são originados:

- a)dos restos epiteliais de Malassez
- b)nas áreas de fusão dos processos faciais
- c)do órgão do esmalte
- d)do folículo

35)No movimento de abertura mandibular, o músculo agonista é o:

- a)ptergoideo medial
- b)ptergoideo lateral
- c)masseter
- d)ramo posterior do masseter

36)A curva que deixa as cúspides linguais dos dentes inferiores mais altas que as vestibulares e neutras, a nível de caninos, é a curva de:

- a)Monson
- b)Wilson positiva
- c)Spee
- d)Wilson negativa

- 37) Segundo a ADA, o padrão de geleificação do Alginato do Tipo I ocorre em:
a) 20 a 30 segundos
b) 30 a 50 segundos
c) 30 a 60 segundos
d) 60 a 120 segundos
- 38) Quando protruímos a mandíbula contara uma força de resistência estaremos:
a) contraindo o masseter
b) distendendo o masseter
c) contraindo o músculo pterigóideo lateral inferior
d) estirando o pterigóideo medial
- 39) O material denominado Tak Hidroplastic, utilizado como variação do acrílico autopolimerizável tem como característica:
a) é um material plástico que amolece em água fria
b) apresenta pouco tempo de trabalho
c) na água fria tem seu tempo de trabalho acelerado
d) não é um material plástico
- 40) O movimento protrusivo provocando desoclusão dos dentes posteriores, gera um espaço denominado:
a) curva de Speil
b) espaço livre interoclusal
c) fenômeno de Cristensen
d) overjet
- 41) Na mastigação, a função muscular que movimentada a mandíbula e facilita a vascularização é chamada de:
a) contração isométrica
b) contração isotônica
c) relaxamento provocado
d) relaxamento controlado
- 42) O método mais amplamente usado em odontologia para o controle da dor é a(o):
a) remoção da causa
b) elevação do limiar da dor
c) bloqueio das vias de condução de impulsos dolorosos
d) impedimento da reação à dor por meio de depressão cortical
- 43) Para que se previna ou se trate a gengivite, faz-se necessária a(o):
a) eliminação da placa bacteriana supragengival
b) escovação diária adequada
c) comparecimento periódico ao dentista
d) controle da placa bacteriana supragengival
- 44) Um dos principais objetivos na prevenção da periodontite é:
a) dificultar o aparecimento de placa subgengival
b) proporcionar eliminação de bolsas
c) facilitar a higiene bucal
d) proceder tratamento endodôntico
- 45) Durante a exposição cirúrgica da ATM, deve-se evitar danos aos ramos temporais do nervo:
a) vestibulococlear
b) troclear
c) facial
d) glossofaríngeo
- 46) Uma alteração neoplástica que tem localização habitual na região de canino superior é o:
a) cisto primordial
b) ameloblastoma
c) cisto dentígero
d) adenoameloblastoma
- 47) A técnica de AKINOSI é usada para bloqueio do nervo mandibular, estando o paciente com a boca:
a) fechada
b) aberta
c) semi-aberta
d) aberta ao máximo
- 48) A gengivite descamativa é encontrada mais frequentemente em:
a) adultos jovens
b) indivíduos na pós-menopausa
c) crianças
d) adolescentes
- 49) A estomatite nicotínica tem localização habitual na(o):
a) bochecha
b) lábio
c) palato
d) língua

- 50)O primeiro determinante da maloclusão do arco dentário é o:
- desenvolvimento anormal da face
 - fator de equilíbrio dentário
 - espaço livre de Nance ausente
 - desequilíbrio entre os tamanhos dos dentes e o do arco
- 51)A mais nova técnica para avaliar a ATM é a:
- tomografia lateral
 - ressonância magnética
 - pneumoartrografia
 - cintilografia
- 52)O material de moldagem que reúne as características de fácil manipulação, conforto para o paciente, baixo custo, e que não exige equipamento elaborado, é o(a):
- hidrocolóide irreversível
 - hidrocolóide reversível
 - godiva
 - resina acrílica
- 53)Das desordens funcionais da dentição, o sinal dentário mais comum, associado ao distúrbio funcional da oclusão, é a(o):
- mobilidade
 - pulpite
 - intrusão
 - desgaste
- 54)Das desordens dos músculos mastigatórios, uma condição que não é de origem muscular é a:
- contratura
 - aderência
 - dor em pontos algícos mio-faciais
 - miosite
- 55)A guta percha, material obturador de canais, apresenta como vantagem:
- não se tornar plástica pelos solventes comuns
 - possuir pouca rigidez, facilitando a obturação de canais curvos
 - não provocar alteração de coloração do dente obturado
 - falta de adesividade nas paredes dos canais
- 56)Lesão radiolúcida solitária, piriforme, localizada entre o incisivo lateral e o canino superior, levando a divergência entre as raízes dos mesmos, é denominada cisto:
- naso-alveolar
 - do canal incisivo
 - da papila palatina
 - glóbulo-maxilar
- 57)A cúspide que entra em contato de oclusão através das vertentes transversais mesial, distal e livre, respectivamente, com a fossa central do primeiro molar inferior, formando três pontos de oclusão denominados de tripodismo é a cúspide:
- disto-palatina do primeiro molar superior
 - mésio-palatina do segundo molar superior
 - palatina do segundo pré-molar superior
 - mésio-palatina do primeiro molar superior
- 58)As lesões brancas, únicas e múltiplas, que podem ser observadas nas cristas alveolares de quase 85% dos recém-nascidos são conhecidas como:
- manchas de Koplic
 - úlceras de Mitkuliez
 - líquen plano
 - nódulos de Bohn
- 59)A hiperplasia papilar inflamatória tem a sua localização mais comum na (o):
- base da língua
 - palato
 - papila gengival
 - borda da língua
- 60)Segundo Angle, quando os incisivos apresentam um overbite temos uma alteração de classe:
- I
 - II – Divisão 1
 - II – Divisão 2
 - III

GABARITO:1B/2B/3 A/4 A/5D/6D/7ANULADA/8D/9B/10ANULADA/11 A/12ANULADA/13 A/14C/15D/16B/17
A/18 A/19B/20D/21 A/22 A/23C/24C/25 A/26B/27 A/28C/29 A/30D/31D/32ANULADA/33
A/34B/35B/36D/37D/38C/39C/40C/41B/42C/43D/44 A/45C/46D/47 A/48B/49C/50D/51B/52
A/53D/54B/55C/56D/57D/58D/59B/60C